

Dépistage à marqueurs multiples

Pour les trisomies 21 et 18



Points importants

- Le dépistage du premier trimestre optimisé (DPTO) et le dépistage du second trimestre (DST) ne sont pas des tests diagnostiques.
- Ce sont des tests de dépistage pour les trisomies 21 et 18.

Résultats du dépistage et points de discussion

Résultat du dépistage	Points de discussion
 Positif	• Un résultat de dépistage positif ne signifie pas que le fœtus ait une différence chromosomique. Il indique que la possibilité est plus élevée que le seuil établi. • En cas de résultat de dépistage positif, la personne enceinte peut choisir entre le dépistage prénatal non invasif (DPNI), un test diagnostique ou de ne pas effectuer de tests prénatals supplémentaires. • Seuls les tests diagnostiques (échantillonnage de villosités chorioniques ou amniocentèse) peuvent fournir une réponse définitive « oui » ou « non ». • Une orientation vers un service de conseil génétique peut être possible. Contactez la clinique de génétique de votre région pour connaître leurs critères d'admission.
 Négatif	• Un résultat de dépistage négatif est rassurant. • Un résultat de dépistage négatif ne garantit pas que le fœtus n'ait pas de différence chromosomique ou de problème de santé. • En l'absence de facteurs de risque supplémentaires, un résultat négatif au dépistage ne devrait pas inciter à proposer un test diagnostique.